

**SAGGIO  
DELL'ISTORIA  
ERBARIA DELLE  
ALPI DI PISTOJA,  
MODENA, E...**

---

Fulgenzio Vitman, Antonio  
Matani



3

*Amico carissimo.*

**L**A renitenza da me in altri tempi dimostrata alle vostre istanze, ed a quelle di parecchi altri amici, di pubblicare i miei Viaggi Botanici, fatti in differenti stagioni per le Alpi, singolarmente di Pistoja, e da me promessi in altra mia Opera: De Medicatis Herbarum viribus, era unicamente originata dalla speranza di potermi altre volte arrampicare per que' scoscesi balzi, e dirupati macigni, per farvi ulteriori, e più comode osservazioni; e scorrere per alcuni luoghi da me non ancora visitati. Ciò di nuovo intrapresi l'anno passato: quando una fierissima Angina, contratta per que' disastrosi cammini, mi obbligò ben tosto a retrocedere d'onde ero partito. Non poteva io dunque soddisfare all'impegno, mentre un giusto riguardo della mia salute mi sforzava a rinunziare ad ogni speranza di potere rendere compita una tale Opera. Erami caduto in pensiero d'intitolarla: Historia inchoata &c.: quando dando nuova oc-

A 2

chia-

4  
chiesta al frontispizio dell' Istoria delle piante degli Svizzeri, fatta recentemente dall' illustre Allero, veggio che questo celebre Autore, ad onta della molteplicità dell' erbe ivi ritrovate, non la chiama con altro nome. Quindi la saggia modestia di sì grand' uomo dovevami essere un utile lezione per cangiar sentimento. L' affare adunque era deciso. Ora, che voi mi somministrate un mezzo opportuno di combinare l' appagamento delle vostre brame con la verità precisa de' fatti, contentandovi di una abbozzata relazione, un ulteriore ritegno degenererebbe in ostinazione. Pertanto vi trasmetto la serie di tutte quelle specie di piante, che ho potuto ritrovare in diversi tempi, con alcune osservazioni replicatamente fatte sopra qualcuna di esse; ed i luoghi, in cui le ho raccolte: limitandomi nel solo regno vegetabile; avendo voi diffusamente trattato nella vostra Opera: Delle produzioni naturali del Territorio di Pistoja, non solo delle altre due parti della Storia Naturale; ma eziandio della Meteorologia, Idrologia &c. del vostro Paese. Qualora in questa, qualunque siasi relazione, non ci troviate l' ordine progressivo de' luoghi, attribuite tal difetto all' appassionata avidità, ardirei dire, singolare ai Botanici, che gli violenta a scorrere irregolarmente qua, e là, per la brama di scoprire nuove piante.

VIAG-



## VIAGGIO

Per le Montagne di Pistoja .

**L**A fama delle Alpi di Pistoja, per la fertilità delle Piante rare, che vi allignano, fu ognora tanto grande, che varj eccellenti Botanici si mossero a visitarle, e ne fecero eziandio onorata menzione nelle loro Opere. In fatti non ad altro oggetto, che per la copia delle produzioni naturali, là si portò dopo Scheuzero, un Vallisnieri, un Tozzi, un Micheli, un Bassi, un Targioni, un Manetti, e varj altri uomini di grande, e sublime ingegno forniti: quali tutti nella numerosa, e scelta famiglia delle Piante, che spontaneamente vi allignano, trovarono onde satollare le loro ben giuste brame. Qual meraviglia dunque se io pure, stimolato da un sì nobile oggetto, mi sia più di una volta determinato di soffrire le molestie di un viaggio sì disastroso?

Partito pertanto dalla Città di Pistoja, ed arrivato al Lago di Serra Pratignana, ivi trovai  
**RANUNCULUS (aquatilis) foliis submersis**

A 3

ca-

capillaceis; emerfis subpeltatis. *Lin. Sp. pl.*  
*Pianta amfibia, quale molto diversifica nell' abito esteriore, quando nasca in paludi seccate: nel qual caso le foglie nitrovansi quasi crespe; i peduncoli de' fiori brevissimi; e spesso volte fiorisce nel mese di Settembre.*

**ARUNDO** (phragmitis) calycibus quinquefloris, paniculâ laxâ. *Lin. Sp. pl.*

**SALIX** (reticulata) foliis integerrimis glabris ovatis obtusis. *Lin. Sp. pl.*

**SALIX** (caprea) foliis ovatis rugosis; subtus tormentosis, undatis superne denticulatis. *Lin. Sp. pl.*

**BIDENS** (tripartita) foliis trifidis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis. *Lin. Sp. pl.*

*Questa pianta ha de' fiori col raggio, altri senza raggio nell' istesso individuo. Quindi se ne deduce, che non senza ragione dubita Linneo, che la Bidens cernua, e la Coreopsis cernua, che rapporta nelle Species plant., differiscano di genere. L' istesso osservasi nella pianta chiamata dall' istesso Linneo Anacyclus Valentinus. Che più? l' istessa Matricaria Offic. ha de' fiori ora col raggio, ora privi di esso. Da tutto ciò si può conchiudere giustamente, che la presenza, o assenza del raggio non può formare l' essenza di un genere.*

**PHELLANDRIUM** (aquaticum) foliorum ramificationibus divaricatis. *Lin. Sp. pl.*

**AMMANNIA** (baccifera) foliis subpetiolatis, capsulis calyce majoribus, coloratis. *Lin. Sp. pl.*

*Questa pianta viene chiamata in oggi dall' Arduini Animad. Botan. Cornelia lacustris.*

*Oltre la figura, che abbiamo di questa pianta nel*

nel *Pluk. Alm.* 33. t. 136. f. 2., avviene un'altra negli *Atti dell' Accad. di Bologna T. 7.*

**FESTUCA** (*fluitans*) paniculâ ramosâ erectâ, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Lin. Sp. pl.*

**POTAMOGETON** (*gramineum*) foliis linearilanceolatis alternis sessilibus stipulâ latioribus. *Lin. Sp. pl.*

Di cui ne dà la figura il *Pétiver* nel suo *Erbario Britannico*.

Alla fonte detta de' Cavalli

**CARDUUS** (*palustris*) foliis decurrentibus dentatis: margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Lin. Sp. pl.*

**JUNGERMANNIA** (*polyanthos*) frondibus simpliciter pinnatis: foliolis integerrimis imbricatis convexis. *Lin. Sp. pl.*

**ALSINE** *Hyperici folio D. Vaill. J. R. H. Alsine* foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petiolis unifloris. *Haller Hist. Stirp. Helv. T. 1. p. 387.*

Questa pianta differisce da tutte le specie di *Stellaria*, che sono rapportate dal *Lin.* nel *Sistem.*

*Nat. ult. ediz.* Se devono rattenersi i generi *Linneani* di tutte le specie di *Alsine*, che contro natura sono separate dal *Linneo*, certamente questa pianta non può appartenere che alle *Stellarie*, avendo dieci stami, i petali bifidi, e tre pistilli; e gli si potrebbe imporre il nome triviale di *Stellaria Hypericifolia*. Ma dovendosi sempre anteporre i generi naturali agli artificiali, non posso non consentire all'autorità del celebre *Allero*, e di altri insigni Botanici, che nell'istesso genere racchiudono tutte le specie di *Alsine*.

Vicino al Reno

**ORNITHOPUS** (perpusillus) foliis pinnatis  
leguminibus subarcuatis. *Lin. Sp. pl.*

**HYPERICUM** (humifusum) floribus trigynis  
axillaribus solitariis, caulibus ancipitibus pro-  
stratis filiformibus, foliis glabris. *Lin. Sp. pl.*

*Tutti i Botanici riconoscono per specie distinta questa pianta. Ma le reiterate osservazioni fatte sopra di essa dal dottissimo, ed umanissimo mio amico Sig. Dottore Lodovico Bellardi Medico Collegiato di Torino, e celebre Botanico, lasciano luogo a dubitarne. Vidde più di una volta questo valente, e indefesso naturalista, che dalle rotte piante dell' Iperico perforato, intorno le radici germogliavano nuove piante, che in tutto il loro abito esteriore erano simili all' Iperico humifuso. Al contrario in un gran tratto di luogo vidde una gran copia di questo, i di cui fusti erano ora brevi, ora lunghi; ora prostrati, ora quasi eretti; altri totalmente tali: talmente che, fuori di tale differenza, difficilmente possono tra di loro distinguersi. Osservò parimente i fiori corimbose; e le foglie con le glandole, sebbene minori.*

Ne' prati delle Panche

**SMYRNIUM** Lusitanicum minus, Apii folio.  
*J. R. H.*

**PIMPINELLA** (Saxifraga) foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis; summis linearibus. *Lin. Sp. pl.*

**GRATIOLE** (officinalis) floribus pedunculatis, foliis lanceolatis serratis. *Lin. Sp. pl.*

**JUNCUS** (bulbosus) foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. *Lin. Sp. pl.*

A pon-



## A ponte Petri

**LICHEN** (stellaris) imbricatus: foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pulvis. *Lin. Sp. pl.*

**POTENTILLA** (recta) foliis septenatis lanceolatis serratis utrimque subpilosis, caule erecto. *Lin. Sp. pl.*

## Sopra Maresca per il Teso

**SENECIO** (viscosus) corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii. *Lin. Sp. pl.*

**HYPERICUM** (montanum) floribus trigynis, calycibus serraturis glandulosis, caule tereti erecto glabro, foliis ovatis. *Lin. Sp. pl.*

**VERBASCUM** (nigrum) foliis oblongo-cordatis petiolatis. *Lin. Sp. pl.*

**SCLERANTHUS** (annuus) calycibus fructibus patulis. *Lin. Sp. pl.*

**SCANDIX** (odorata) feminibus sulcatis angulatis. *Lin. Sp. pl.*

**HERACLEUM** (Panaces) foliis pinnatis; foliolis quinis; intermediis sessilibus, floribus radiatis. *Lin. Sp. pl.*

**CLINOPODIUM** (vulgare) capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis. *Lin. Sp. pl.*

**ANGELICA** (silvestris) foliis æqualibus ovato-lanceolatis serratis. *Lin. Sp. pl.*

**CNICUS** (Erisithales) foliis amplexicaulibus pinnatifidis hirsutis, calycibus nutantibus glutinosis. *Lin. Sp. pl.*

**CENTAUREA** (benedicta) calycibus duplicato-spinosis, lanatis involucreatis, foliis semidecurrentibus denticulo-spinosis. *Lin. Sp. pl.*

**CHENOPODIUM** (Bonus Henricus) foliis trian-

triangulari - sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis. *Lin. Sp. pl.*

*In tutte le sorti di piaghe, ed ulcere sordide non fanno altro uso i Montanari, che delle foglie fresche di quest' erba.*

**CARDAMINE** (asarifolia) foliis simplicibus subcordatis. *Lin. Sp. pl.*

*Il suddetto Sig. Dott. Bellardi, la di cui maggiore delizia essendo lo studio della Botanica, in mezzo alle sue occupazioni cliniche, ogni anno dona qualche mese alla medesima, portandosi or qua, or là su le montagne, mosso da un ardentissimo zelo di scoprire sempre qualche nuova pianta; quindi avendo scorso in diversi tempi tutte le montagne del Piemonte, e della Savoia, senza perdonare a veruna fatica, e spesa, l'anno passato visitò, sempre per l'istesso soggetto, le montagne tutte, e le spiagge marittime della Contea di Nizza; le di cui scoperte, e lumi acquistati, non poco lustro apporteranno alla Storia naturale. Egli dunque mi assicura, che questa pianta non poco differisce sì nelle foglie, che nelle filique. Nelle Alpi della Savoia l'ha veduta più d'una volta con foglie undulate, con le dentature più rare; e le filique divergenti. Nelle Alpi di Nizza trovò una specie di Cardamine, che aveva una grande affinità con la nostra; ma le foglie erano del tutto dentate; le filique numerose, dritte, e vicine al caule; come osservasi nel Sisimbrio Tanacetifolio del Lin.*

**CARDAMINE** (amara) foliis pinnatis, axillis stoloniferis. *Lin. Sp. pl.*

**THAPSIA** montana omnium maxima, foliis lobata-

batis. *Mich.* Seu *Angelica montana altissima*,  
quæ valde bonæ nomine misa. *J. B.*

Più su nel medesimo Teso

**MELISSA** (*grandiflora*) *pedunculis axillaribus*  
*dichotomis longitudine florum. Lin. Sp. pl.*

*Gli Speciali de' luoghi subalpini del Piemonte da*  
*tutta la pianta ne estraggono un' acqua distil-*  
*lata, che nell' odore, e sapore confonde si con*  
*quella della Menta Piperitide; quindi se ne*  
*servono impunemente in luogo di essa.*

**SCORZONERA** (*purpurea*) *foliis lineari-su-*  
*bulatis integris planis, pedunculis cylindri-*  
*cis. Lin. Sp. pl.*

**EPILOBIUM** (*alpinum*) *foliis oppositis ova-*  
*to-lanceolatis integerrimis, filiquis sessili-*  
*bus, caule repente. Lin. Sp. pl.*

**LILIUM** (*Martagon*) *foliis verticillatis, flori-*  
*bus reflexis, corollis revolutis. Lin. Sp. pl.*

**LILIUM** (*Chalcedonicum. y*) *foliis spartis,*  
*lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolu-*  
*tis. Lin. Sp. pl.*

**ALCHEMILLA** (*vulgaris*) *foliis lobatis. L. Sp. pl.*

**POTENTILLA** (*aurea*) *foliis radicalibus qui-*  
*natis serratis acuminatis; caulinis ternatis,*  
*caule declinato. Lin. Sp. pl.*

**SORBUS** (*aucuparia*) *foliis pinnatis utrimque*  
*glabris. Lin. Sp. pl.*

**CRATÆGUS** (*Aria*) *foliis ovatis inæqualiter*  
*serratis subtus tormentosis. Lin. Sp. pl.*

*Una insigne varietà di quest' albero fu trovata*  
*dal Sig. Medico Bellardi su le Alpi della Ta-*  
*rantasia, vicino al luogo detto Pralognan, che*  
*meritando di esserne formata una nuova specie,*  
*vien chiamata da esso: Sorbus pumila, foliis*  
*ovatis, serratis, glabris.*

Nella

Nella selva del Tefo

**ATROPA** (Belladonna) caule herbaceo, foliis ovatis, integris. *Lin. Sp. pl.*

**SPIRÆA** (ulmaria) foliis pinnatis; impari majore lobato, floribus cymosis. *Lin. Sp. pl.*

**SPIRÆA** (Filipendula) foliis pinnatis; foliolis uniformibus serratis; caule herbaceo, floribus cymosis. *Lin. Sp. pl.*

**CYCLAMEN** (europeum) corollâ retroflexâ. *Lin. Sp. pl.*

**ÆGOPODIUM** (Podagraria) foliis caulinis summis ternatis. *Lin. Sp. pl.*

**HERACLEUM** (Panaces) foliis pinnatis; foliolis quinis: intermediis sessilibus, floribus radiatis. *Lin. Sp. pl.*

**MELISSA** (grandiflora) pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum. *Lin. Sp. pl.*

**BUNIU** (Bulbocastanum). *Lin. Sp. pl.*

**CAMPANULA** (rotundifolia y.) foliis radicalibus reniformibus; caulinis linearibus. *Lin. Sp. pl.* Campanula alpina linifolia cœrulea. *B. pin. 93.*

**ANTIRRHINUM** (purpureum) foliis quaternis linearibus caule florifero erecto spicato. *Lin. Sp. pl.*

**VACCINIUM** (Myrtillus) pedunculis unifloris, foliis serratis, ovatis deciduis, caule angulato. *Lin. Sp. pl.*

**VACCINIUM** (Vitis idæa) racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. *Lin. Sp. pl.*

*I Vecchi catarrofi di queste montagne si servono dell'infusione delle foglie di questa pianta, ad uso di Tè, per sollievo del loro incomodo.*

**RU-**

**RUBUS** (fruticosus) foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis.

*Lin. Sp. pl.*

**ADOXA** (Moschatellina). *Lin. Sp. pl.*

**FRAGARIA** (vesca) flagellis reptans. *Lin. Sp. pl.*

**PYROLA** (rotundifolia) flaminibus adscendentibus, pistillo declinato. *Lin. Sp. pl.*

**LYSIMACHIA** (vulgaris) paniculata, racemis terminalibus. *Lin. Sp. pl.*

**PHYTEUMA** (spicata) spicâ oblongâ, capsu- bilocularibus, foliis radicalibus cordatis.

*Lin. Sp. pl.*

Vicino a S. Marcello

**ASARUM** (europeum) foliis reniformibus obtusis binis. *Lin. Sp. pl.*

**ARABIS** (alpina) foliis amplexicaulibus dentatis. *Lin. Sp. pl.*

**CISTUS** (guttatus) herbaceus exstipulatus, foliis oppositis lanceolatis trinerviis, racemis ebracteatis. *Lin. Sp. pl.*

**MONOTROPA** (Hypopithys) floribus lateralibus octandris; terminali decandro. *Lin. Sp. pl.*

Vicino alle Prata

**SPIRÆA** (Aruncus) foliis supradecompositis, spicis paniculatis, floribus dioicis. *Lin. Sp. pl.*

**GERANIUM** (phæum) pedunculis bifloris foliisque alternis, calycibus subaristatis; caule erecto petalis undulatis. *Lin. Sp. pl.*

**POLYPODIUM** (aculeatum) frondibus bipinnatis; pinnis lunulatis ciliato-dentatis, stipite strigoso. *Lin. Sp. pl.*

**ACROSTICHUM** (marantæ) frondibus subbipinnatis; pinnis opposito-coadunatis, subtus hirsutissimis; basi subdentatis. *Lin. Sp. pl.*

Per

Per Caldaja

**VERBASCUM** alpinum Sclareæ indicæ foliis.

*Bassi Inst. Bonon. Tom. 4. pag. 291, con una elegante figura.*

*Questa pianta fu trovata nelle Alpi, prima di ogni altro, dal celebre Sig. Dott. Giuseppe Monti, padre del dottissimo, ed umanissimo Sig. Dott. Gaetano Monti, odierno Professore di Botanica in Bologna sua patria. Egli la denominò: Verbascum Ætiopidis folio. Quindi in appresso nell' istesso sito fu trovata dal Micheli, che la chiamò: Verbascum alpinum, nigrum, Sclareæ foliis, flore luteo parvo, staminibus cum apicibus croceis, & lanugine purpureâ tectis: di cui ancora fa menzione Michel' Angiolo Tilli nel catalogo delle piante dell' Orto Pisano.*

**CARDAMINE** (Chelidonia) foliis pinnatis; foliolis quinis incis. *Lin. Sp. pl.*

**BETONICA** alpina, incana, purpurea. *Barrel. Icon. 340.*

**SATYRIUM** (albidum) bulbis fasciculatis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido acuto; laciniâ intermediâ obtusâ. *Lin. Sp. pl.*

**LUNARIA** (annua) foliis oppositis. *Lin. Sp. pl.*

**RUMEX** (alpinus) floribus hermaphroditis sterilibus femineisque, valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis obtusis rugosis. *Lin. Sp. pl.*

**AQUILEGIA** (alpina) nectariis rectis petalo lanceolato brevioribus. *Lin. Sp. pl.*

**TRIFOLIUM** (montanum) spicis subimbricatis subtribus, vexillis subulatis emarcescentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Lin. Sp. pl.*

**ARNICA** (scorpioides) foliis alternis serratis. *Lin. Sp. pl.*

VER-

**VERBASCUM** (nigrum) foliis oblongo-cordatis petiolatis. *Lin. Sp. pl.*

**POLYGONUM** (viviparum) caule simplicissimo monostachyo, foliis lanceolatis. *Lin. Sp. pl.*

**ALCHEMILLA** (alpina) foliis digitatis serratis. *Lin. Sp. pl.*

**PARIS** (quadrifolia). *Lin. Sp. pl.*

**ASPERULA** (odorata) foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis. *Lin. Sp. pl.*

**CHRYSANTHEMUM** (atratum) foliis omnibus cuneiformi-oblongis serratis carnosis. *Lin. Sp. pl.*

**CENTAUREA** (phrygia) calycibus recurvato-plumosis, foliis indivisis. *Lin. Sp. pl.*

**BUNIUM** (Bulbocastanum). *Lin. Sp. pl.*

**VIOLA** (biflora) caule bifloro, foliis reniformibus serratis. *Lin. Sp. pl.*

**VIOLA**. *Haller Histinck. Stirp. Helv. num. 568.*

*Dubito, che questa sia l'istessa di quella, detta: Viola tricolor arvensis. Imperciocchè osservavo in essa i fiori più grandi a proporzione che salivo il monte; anzi nell'istesso individuo trovavo fiori maggiori, e minori. Nella Viola grandiflora i fusti sono prostrati, ramosi, e brachiati, come nota l'istesso Allero nel luogo citato: ma queste note le ho ritrovate ancora nella seconda, nata in luoghi campestri. Non può esprimersi quanto varii questa specie secondo i diversi luoghi, ove nasce; quindi temo, che l'istessa Viola calcinata del Linneo, altro non sia, che una varietà della campestre di tre colori.*

**BETONICA** foliis ovatis, rotunde crenatis,  
spi-

spicà ovatà , compactà . Haller *Hist. incb. Stirp. Helv. n. 265.*

*Pianta non solamente distinta dalla volgare nell'abito esteriore ; ma eziandio differisce nella struttura de' fiori , appartenendo piuttosto al genere della Stachide . Vid. Hall. loco cit. Differisce dalla Betonica Alopecuroide .*

**A** Mandromini , monte sopra ogni altro di que' luoghi feracissimo di piante rare , e da me più volte visitato ; così denominato , perchè dà un gran pascolo agli armenti .

**DRYAS** (oëtopetala) floribus oëtopetalis, foliis simplicibus . *Lin. Sp. pl.*

*Questa pianta è stata trovata più volte e da me, e dal Sig. Dottore Bellardi con sei soli petali ; quindi anderebbe gli cangiato quel nome triviale.*

**VERONICA** . . . . . floribus carneis . Haller *Hist. stirp. Helv.*

*Differisce dalla Veronica alpina L. nelle foglie maggiori , e lanceolate ; ne' fiori carnicini , con vene porporine ; e particolarmente nel calice peloso .*

**VERONICA** (aphylla) corymbo terminali, scapo nudo . *Lin. Sp. pl.*

**VERONICA** (fruticulosa) corymbo terminali, foliis lanceolatis, obtusiusculis, caulibus fruticulosus . *Lin. Sp. pl.*

**PÆDEROTA** (Bonarota) foliis serratis . *Lin. Sp. pl.*

**CAMPANULA** (rotundifolia) foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus . *Lin. Sp. pl.*

**CAMPANULA** (petræa) caule angulato simplici, floribus sessilibus capitato-glomeratis, foliis subtus tomentosis . *Lin. Sp. pl.*

**CAM-**



**CAMPANULA** (glomerata) caule angulato,  
simplici; floribus sessilibus, capitulo termi-  
nali. *Lin. Sp. pl.*

**SAXIFRAGA** (cuneifolia) foliis cuneiformi-  
bus obtusissimis, repandis; caulenudo pani-  
culato. *Lin. Sp. pl.*

**ALCHEMILLA** (vulgaris) foliis lobatis. *L. Sp. pl.*

**ALCHEMILLA** (alpina) foliis digitatis ferra-  
tis. *Lin. Sp. pl.*

**HYPERICUM** alpinum, humilius, magno flo-  
re punctato. *J. R. H.*

*Trovato ivi ancora dal celebre Sig. Ferdinando Bassi; e di cui ne dà un elegante Figura nell' Instit. Bonon. Tom. 4. Il Micheli, che trovò prima di noi due tal pianta in detto sito, non avvedendosi essere quella, che rapporta il Turnefort colla suddetta denominazione, la chiamò Hypericum an alpinum humilius magno flore punctato? Io non dubito uniformarmi al sentimento del dottissimo Sig. Ferdinando Bassi, essere quell' istessa specie, che descrive il Pluknezio nella sua Phytographia Tab. 93. Fig. 6.*

**VERONICA** (Bellidioides) corymbo termina-  
li, caule ascendente diphylo. *Lin. Sp. pl.*

**VERONICA** (latifolia) racemis lateralibus;  
foliis cordatis rugosis dentatis; caule stricto.  
*Lin. Sp. pl.*

**SAMBUCUS** (racemosa) racemis compositis  
ovatis; caule arboreo. *Lin. Sp. pl.*

**DAPHNE** (Mezereum) floribus sessilibus ternis  
caulinis; foliis lanceolatis caulinis. *Lin. Sp. pl.*

**PEDICULARIS** (rostrata) caule subramoso;  
corollis galea rostrato-acuminatis, calycibus  
subhirsutis. *Lin. Sp. pl.*

B

FU-

**FUMARIA** (bulbosa) caule simplici, bracteis longitudine florum. *Lin. Sp. pl.*

**ASTRANTIA** (major) foliis quinquelobis; lobis trifidis. *Lin. Sp. pl.*

**ANGELICA** alpina ad nodos florida. *J.R.H. 313.*

**ERUCA** frutescens alpina, reptante radice. *Monti in Zanon. 504. Tab. 73.*

**LINARIA** alpina tetraphylla, floribus violaceis parvis. *Mich.*

*Pianta nè veduta, nè descritta da veruno prima del Micheli; e di cui ne dà un' elegante figura il Sig. Ferdinando Bassi Instit. Bon. T. 4., alla di cui denominazione ha aggiunto la nota di erecta; e ciò saggiamente, per distinguerla dalla Linaria quadrifolia supina. J.R.H., pianta ancor' essa molto ragguardevole, e che nasce in abbondanza nelle montagne degli Svizzeri, come abbiamo dal Sig. Allero. I fusticelli di questa nostra Linaria, trasportata che sia negli Orti, non sono dritti, come nel patrio suolo, ma deboli, e inclinati.*

**GENTIANA** (purpurea) corollis quinquefidis, campaniformibus verticillatis, calycibus subspathaceis. *Lin. Sp. pl.*

**GENTIANA** (Asclepiadea) corollis quinquefidis campanulatis punctatis verticillatis; calycibus quinqueidentatis. *Lin. Sp. pl.*

*Alle volte varia nella corolla tagliata in sei parti.*

**GENTIANA** (verna) corollâ quinquefidâ, infundibuliformi caulem excedente; foliis radicalibus confertis majoribus. *Lin. Sp. pl.*

**GENTIANA** (acaulis) corollâ quinquefidâ campanulatâ, caulem excedente. *Lin. Sp. pl.*

**GENTIANA** (cruciata) corollis quadrifidis, im-

imberbibus ; floribus verticillatis sessilibus ,  
*Lin. Sp. pl.*

GENTIANA ( utriculosa ) corollis quinquefidis hypocrateriformibus ; calycibus plicato-alatis . *Lin. Sp. pl.*

GENTIANELLA omnium minima . *B. Hall. Hist. Stirp. Helv. Tab. XVII.*

VALERIANA ( celtica ) floribus triandris ; foliis ovato-oblongis, obtusis, integerrimis .  
*Lin. Sp. pl.*

VALERIANA ( montana ) floribus triandris ; foliis ovato-oblongis subdentatis ; caule simplici . *Lin. Sp. pl.*

VALERIANA ( tripteris ) floribus triandris ; foliis dentatis radicalibus cordatis ; caulinis ternatis, ovato-oblongis . *Lin. Sp. pl.*

SOLDANELLA ( alpina ) . *Lin. Sp. pl.*

RANUNCULUS ( alpestris ) foliis radicalibus subcordatis obtusis tripartitis, lobis trilobatis ; caulino lanceolato integerrimo , caule unifloro . *Lin. Sp. pl.*

RANUNCULUS ( Aconitifolius ) foliis omnibus quinatis lanceolatis inciso-ferratis . *L. Sp. pl.*

PARNASSIA ( palustris ) . *Lin. Sp. pl.*

CHEIRANTHUS ( Erytimoides ) foliis lanceolatis dentatis, caule recto ; filiquis tetragonis .  
*Lin. Sp. pl.*

LEUCOIUM angustifolium alpinum, flore sulphureo . *Allion. Pedem. 44. t. 9. f. 3. di cui, unitamente ad una esatta descrizione ne dà una elegante figura.*

SERAPIAS ( longifolia ) bulbis fibrosis ; floribus erectis bractea longioribus . *Lin. Sp. pl.*

SATYRIUM ( nigrum ) bulbis palmatis ; foliis  
B 2 lineæ-

- linearibus; floribus resupinatis, nectario labio indiviso ovato acuminato. *Lin. Sp. pl.*
- SATYRIUM** (albidum) bulbis fasciculatis; foliis lanceolatis; nectarii labio trifido acuto; laciniâ intermediâ obtusâ. *Lin. Sp. pl.*
- ORCHIS** (globosa) bulbis indivisis, nectarii labio trifido medio trilobo; cornu brevi, petalis apice subulatis. *Lin. Sp. pl.*
- ORCHIS** (bifolia) bulbis indivisis, nectario labio lanceolato integerrimo; cornu longissimo; petalis patentibus. *Lin. Sp. pl.*
- ORCHIS** (abortiva) bulbis fasciculatis filiformibus; nectarii labio ovato integerrimo. *Lin. Sp. pl.*
- ORCHIS** (maculata) bulbis palmatis patentibus; nectarii cornu germinibus brevioribus; labio plano, petalis dorsalibus patulis. *L. Sp. pl.*
- CONVALLARIA** (Polygonatum) foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti; pedunculis axillaribus subunifloris. *Lin. Sp. pl.*
- CONVALLARIA** (verticillata) foliis verticillatis. *Lin. Sp. pl.*
- LUNARIA** (annua) foliis oppositis. *Lin. Sp. pl.*
- TRIFOLIUM** (Spadiceum) spicis ovalibus imbricatis; vexillis deflexis persistentibus, calycibus pilosis, caule erecto. *Lin. Sp. pl.*
- ANEMONE** (Pulsatilla) pedunculo involucrato; petalis rectis; foliis bipinnatis. *Lin. Sp. pl.*
- ANEMONE** (Narcissiflora) floribus umbellatis; seminibus depresso-ovalibus nudis. *Lin. Sp. pl.*
- MELLITIS** (Melissophyllum). *Lin. Sp. pl.*
- Dell' infusione di questa pianta fatta ad uso di Tè se ne servono i Montanari nella soppressione di orina.*

EU-

**EUPHRASIA** alpina parva, luteis floribus. *B.*  
*Sebbene l'Allero con altri Botanici considerino*  
*questa pianta per varietà della volgare, tut-*  
*tavolta mi sembrerebbe, che se ne dovesse for-*  
*mare una specie distinta.*

**STACHYS** (alpina) verticillis multifloris; fo-  
 liorum serraturis apice cartilagineis; corol-  
 lis labio plano. *Lin. Sp. pl.*

**STACHYS** (sylvatica) verticillis sexfloris; fo-  
 liis cordatis petiolatis. *Lin. Sp. pl.*

**POTENTILLA** (caulescens) foliis quinatis, a-  
 pice conniventibus serratis; caulibus multi-  
 floris erectis; receptaculis hirsutis. *Lin. Sp. pl.*

*I fusti di questa pianta molte volte gli ho osser-*  
*vati pendenti, e non dritti.*

**CERASTIUM** (alpinum) foliis ovato-lanceo-  
 latis, caule diviso, capsulis oblongis. *L. Sp. pl.*  
*Questa pianta soggiace a molte variazioni.*

**SEMPERVIVUM** (arachnoideum) foliis pilis  
 intertextis, propaginibus globosis. *Lin. Sp. pl.*

**SEDUN** (rubens) foliis fusiformibus subdepres-  
 sis; infimis quaternis, cymâ subquadrifidâ,  
 floribus pentandris, seminibus reflexis. *L. Sp. pl.*

**POLYGONUM** (bistorta) caule simplicissimo  
 monostachyo; foliis ovatis in petiolum de-  
 currentibus. *Lin. Sp. pl.*

**SCORZONERA** (purpurea) foliis lineari-fu-  
 bulatis integris planis, pedunculis cylindri-  
 cis. *Lin. Sp. pl.*

**ARNICA** (montana) foliis ovatis integris,  
 caulinis geminis oppositis. *Lin. Sp. pl.*

*I Montanari se ne servono come dell' Elleboro*  
*nella peste degli Armenti.*

**DORONICUM** (pardalianches  $\beta$ ) foliis cor-  
 da-

dati, obtusis dentatis; radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Lin. Sp. pl.*

*Ho veduto più d' una volta mangiare impunemente la radice di questa pianta.*

**CINERARIA** (alpina) umbellâ involucrata, pedunculo communi nudiusculo; foliis oblongis villosis. *Lin. Sp. pl.*

**CINERARIA** (integrifolia). *Lin. Sp. pl.*

**BUPHTALMUM** (grandiflorum) foliis alternis lanceolatis subdenticulatis glabris; calycibus nudis; caule herbaceo. *Lin. Sp. pl.*

**ERIGERON** (alpinum) caule subbifloro; calyce subhirsuto. *Lin. Sp. pl.*

**TUSSILAGO** (alpina) scapo subnudo unifloro; foliis cordato-orbiculatis crenatis. *Lin. Sp. pl.*

**CENTAUREA** (Rhapontica) calycibus scariosis; foliis ovato-oblongis denticulatis, integris petiolatis, subtus tomentosis. *L. Sp. pl.*

**FILAGO** (Leontopodium) caule simplicissimo, capitulo terminali, bracteis hirsutissimis radiato. *Lin. Sp. pl.*

**CARLINA** (acaulis) caule unifloro flore brevior. *Lin. Sp. pl.*

**ACTÆA** (Spicata nigra) racemo ovato, fructibusque baccatis. *Lin. Sp. pl.*

**CISTUS** (Marifolius) suffruticosus exstipulatus; foliis oppositis oblongis petiolatis planis; subtus incanis. *Lin. Sp. pl.*

**GEUM** (montanum  $\beta$ ) flore inclinato solitario, fructu oblongo, aristis plumosis rectis. *Lin. Sp. pl.*

**TEUCRIUM** (montanum) corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis. *Lin. Sp. pl.*

VE.

VERATRUM (album) racemo supradecomposito, corollis erectis. *Lin. Sp. pl.*

*Chi non sa l'accortezza di que' providi Alpigiani, crederebbe che in queste montagne di mille, e rari Semplici fornite, vi si ritrovasse poca quantità di Elleboro bianco. Conoscendone eglino la di lui efficacia per guarire la rogna delle pecore, lo coprono con de' rami di Alberi, affinchè non gli venga tolto dai rizotomi.*

ARABIS (alpina) foliis amplexicaulibus dentatis. *Lin. Sp. pl.*

GERANIUM (sanguineum) pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis. *Lin. Sp. pl.*

GERANIUM (argenteum) pedunculis bifloris; foliis subpeltatis septempartitis trifidis, tomentoso-sericeis; petalis emarginatis. *Lin. Sp. pl.*

FUMARIA (capnoides) filiquis linearibus tetragonis, caulibus diffusis acutangulis. *L. Sp. pl.*

AGROSTIS (Calamagrostis) paniculâ incrassatâ, petalo anteriore toto lanato, apice aristato, caule ramoso. *Lin. Sp. pl.*

CYNOSURUS (cœruleus) bracteis integris. *Lin. Sp. pl.*

SESLERIA cœrulea. *Scop.*

*In fatti questa specie di Gramigna richiede un nuovo genere; come sembra ancora al Signor Aller Hist. ineb. Stirp. Helv.*

AVEA (flavescens) paniculâ laxâ, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. *Lin. Sp. pl.*

PHLEUM (alpinum) spicâ ovato-cylindraccâ. *L. Sp. pl.*

B 4

Al-

**AIRA** (cespitosa) foliis planis, paniculâ patente; petalis basi villosis aristatisque; aristâ rectâ brevi. *Lin. Sp. pl.*

**FESTUCA** (amethystina) paniculâ flexuosâ, spiculis secundis inclinatis, submuticis; foliis setaceis. *Lin. Sp. pl.*

**ACROSTICHUM** (marantæ) frondibus subbipinnatis, pinnis opposito-coadunatis, subtus hirsutissimis; basi subdentatis. *Lin. Sp. pl.*

**POLYPODIUM** (rhaeticum) frondibus bipinnatis; foliolis pinnisque remotis lanceolatis, ferraturis acuminatis. *Lin. Sp. pl.*

**OSMUNDA** (Lunaria) scapo caulino solitario, fronde pinnatâ solitariâ. *Lin. Sp. pl.*

**ASPLENIUM** (Adiantum nigrum) frondibus subtripinnatis, foliolis alternis; pinnis lanceolatis, inciso-ferratis. *Lin. Sp. pl.*

**POLYTRICHUM** (commune) caule simplici. *Lin. Sp. pl.*

**HYPNUM** (crispum) furculis ramosis, frondibus subpinnatis; foliolis undulatis planis. *Lin. Sp. pl.*

**HYPNUM** (cupressiforme) furculis subpinnatis; foliis secundis recurvis, apice subulatis. *Lin. Sp. pl.*

**LICHEN** (furfuraceus) foliaceus, decumbens, furfuraceus, laciniis acutis, subtus lacunosis, atris. *Lin. Sp. pl.*

**LICHEN** (Fraxineus) foliaceus erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunofus glaber; scutellis subpedunculatis. *Lin. Sp. pl.*

**LICHEN** (farinaceus) foliaceus erectus compressus ramosus farinaceus, lateribus verrucosis. *Lin. Sp. pl.*



**LICHEN** (Islandicus) foliaceus adscendens laciniatus, marginibus elevatis ciliatis. *L. Sp. pl.*

**LYCOPERDON** (Bovista) subrotundum, lacerato-dehiscens. *Lin. Sp. pl.*

**VERBASCUM** (nigrum) foliis oblongo-cordatis, petiolatis. *Lin. Sp. pl.*

**TRIFOLIUM** (alpinum) scapo nudo, leguminibus dispermis pendulis; foliis lineari-lanceolatis. *Lin. Sp. pl.*

Per la Faggeta di Mandromini

**LONICERA** (pyrenaica) pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis oblongis glabris. *L. Sp. pl.*

**VALERIANA** (Saxatilis) floribus triandris; foliis subdentatis radicalibus ovatis, caulinis lineari-lanceolatis. *Lin. Sp. pl.*

**SENECIO** (sylvaticus) corollis revolutis; foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymbofo erecto. *Lin. Sp. pl.*

**EPILOBIUM** (alpinum) foliis oppositis ovato-lanceolatis integerrimis; siliquis sessilibus, caule repente. *Lin. Sp. pl.*

**ACROSTICUM** (Thelypteris) frondibus pinnatis, pinnis pinnatifidis integerrimis. *L. Sp. pl.*

Tra la Faggeta, ed il prato, che conduce alla fonte de' Cavalli

**CAREX** (montana) spicis femineis sessilibus subfolitariis ovatis, masculæ approximatis; culmo nudo, capsulis pubescentibus. *L. Sp. pl.*

Intorno a detta fonte

**THESIUM** (Linophyllum) paniculâ foliatâ, foliis lineari-lanceolatis. *Lin. Sp. pl.*

**TURRITIS** (glabra) foliis radicalibus dentatis hispida, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Lin. Sp. pl.*

ASTRA-

- ASTRAGALUS** (*glycyphyllos*) *caulescens prostratus*; leguminibus subtriquetris arcuatis; foliis ovalibus, pedunculo longioribus. *Lin. Sp. pl.*  
**BISCUTELLA** (*auriculata*) calycibus nectario utrimque gibbis, filiculis in stylum coeuntibus. *Lin. Sp. pl.*

Verfo il corno alle Scale

- BISCUTELLA** (*didyma*) filiculis orbiculato-didymis, à stylo divergentibus. *Lin. Sp. pl.*  
**SAXIFRAGA** (*burseriana*) foliis aggregatis imbricatis subulatis levibus, caule subnudo unifloro. *Lin. Sp. pl.*

- SAXIFRAGA** *alpina*, foliis glaucis acutis, monanthos, caule folioso. *Seguier supp. 201. t. 5. fig. 2.*

- POLYGONUM** (*viviparum*) caule simplicissimo monostachyo, foliis lanceolatis. *Lin. Sp. pl.*  
**POTENTILLA** (*argentea*) foliis quinatis cuneiformibus incisus subtus tomentosis, caule erecto. *Lin. Sp. pl.*

- POTENTILLA** (*nitida*) foliis quinatis tomentosis conniventi-tridentatis, caulibus unifloris, receptaculis lanatis. *Lin. Sp. pl.*

- GENTIANA** (*purpurea*) corollis quinquefidis campaniformibus verticillatis, calycibus subspathaceis. *Lin. Sp. pl.*

- CENTAUREA** (*Rhapontica*) calycibus scariosis, foliis ovato-oblongis denticulatis integris petiolatis, subtus tomentosis. *Lin. Sp. pl.*

- CARLINA** (*acaulis*) caule unifloro, flore brevior. *Lin. Sp. pl.*

In un masso per la salita di detto corno

- SAXIFRAGA** (*hypnoides*) foliis caulinis linearibus integris trifidisve; stolonibus procum-

cumbentibus; caule erecto, nudiusculo. *Lin. Sp. pl.*

**SAXIFRAGA** (Cotyledon) foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-ferratis, caule paniculato. *Lin. Sp. pl.*

**PAPAVER** (alpinum) capsulâ hispidâ, scapo unifloro nudo hispido, foliis bipinnatis. *L. Sp. pl.*

Alla fine della falita

**VIOLA** (calcarata  $\beta$ ) caule abbreviato, floris nectario subulato petalis longiore, foliis subovatis; stipulis dentatis. *Lin. Sp. pl.*

**VIOLA** (biflora) caule bifloro, foliis reniformibus ferratis. *Lin. Sp. pl.*

**JUNIPERUS** (communis  $\gamma$ ) foliis ternis patentibus mucronatis, baccâ longioribus. *Lin. Sp. pl.*

Tra que' massi dirupati

**EUPHRASIA** alpina parva, luteis floribus. *B. Haller Hist. jürp. Helv.*

**DRABA** (alpina) scapo nudo simplici; foliis lanceolatis integerrimis. *Lin. Sp. pl.*

**SAXIFRAGA** (cæsia) foliis linearibus subtus punctatis aggregatis recurvatis, caule nudo multifloro. *Lin. Sp. pl.*

**ASTER** (alpinus) foliis lanceolatis hirtis, radicalibus obtusis; caule simplicissimo unifloro. *Lin. Sp. pl.*

**TUSSLAGO** (alpina) scapo subnudo unifloro, foliis cordato-orbiculatis crenatis. *Lin. Sp. pl.*

**VERONICA** (fruticulosa) corymbo terminali, foliis lanceolatis obtusiusculis, caulibus fruticulosis. *Lin. Sp. pl.*

**JUNCUS** (trifidus) culmo nudo, foliis, floribusque tribus terminalibus. *Lin. Sp. pl.*

*Il Sig. Medico Bellardi, erborizzando per le montagne della Savoia, mi notificò avere veduto diverse piante di questo Giunco, provenienti dall'istesso cespuglio, alcune delle quali avevano un sol fiore, altre due, altre tre. Quindi pare, che meritamente possa dedursi, che il Giunco trifido del Linneo, e quello detto dallo Scopoli, e Jacquin Monanthos formino una sola specie.*

**TRIFOLIUM** (alpinum) scapo nudo, leguminibus dispermis pendulis; foliis lineari-lanceolatis. *Lin. Sp. pl.*

**CHRYSANTHEMUM** (alpinum) foliis cuneiformibus pinnatifidis, laciniis integris, caulibus unifloris. *Lin. Sp. pl.*

**OSMUNDA** (Lunaria) scapo caulino solitario, fronde pinnatâ solitariâ. *Lin. Sp. pl.*

**GLOBULARIA** (cordifolia) caule subnudo; foliis cuneiformibus tricuspidatis, intermedio minimo. *Lin. Sp. pl.*

**SEMPERVIVUM** (arachnoideum) foliis pilis intertextis, propaginibus globosis. *Lin. Sp. pl.*

**HYPOCHERIS** (maculata) caule subnudo, ramo solitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. *Lin. Sp. pl.*

*I Montanari si servono di questa pianta ne' principj della Tisi.*

**SILÈNE** (Saxifraga) caulibus unifloris, pedunculis longitudine caulis; foliis glabris; floribus hermaphroditis, femineisque. *Lin. Sp. pl.*

**POTENTILLA** (erecta) foliis septenatis lanceolatis ferratis, utrimque subpilosis; caule erecto. *Lin. Sp. pl.*

Per

Per la Riguccia

**GENTIANA** (*campestris*) corollis quadrifidis,  
fauce barbatis. *Lin. Sp. pl.*

**RANUNCULUS** (*Parnassifolius*) foliis subova-  
tis nervosis integerrimis petiolatis. *Lin. Sp. pl.*

Arrivammo al rinomato Lago Scafajolo, di cui ciascuno ben fa esservi la inveterata tradizione, della quale, prima di Gesnero, ne parlò il nostro Boccaccio, che si sollevi cioè una orribile tempesta, alloraquando si getti in detto Lago una pietra, o un legno con violenza: lasciando io frattanto al P. Fromond, ed agli altri Fifici di decidere della probabilità del fatto.

Intorno a questo Lago, vi osservai

**SESELI** (*pumilum*) petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris; foliolis ternatis, linearibus subcarnosis, petioli longitudine.

*Lin. Sp. pl.*

**SIFON** (*inundatum*) repens, umbellis bifidis.

*Lin. Sp. pl.*

**SAXIFRAGA** alpina Ericoides, flore cœruleo.

*J. R. H. Saxifraga purpurea. Allion. Misc. H. R. T.*

Di cui parlando il chiarissimo Scheuzero nel suo viaggio alpino dice, che in summis Alpium jugis, horumve saxis mire semper denudatis, proreptat &c.

Ne' fossi del Sestajone

**SAXIFRAGA** (*hypnoides*) foliis caulinis linearibus integris trifidisve, stolonibus procumbentibus; caule erecto nudiusculo. *Lin. Sp. pl.*

**ASARUM** (*Europæum*) foliis reniformibus obtusis binis. *L. Sp. pl.*

CIR-

**CIRCÆA** (alpina) caule adscendente, racemo unico. *Lin. Sp. pl.*

**CHRYSOSPLENIUM** (oppositifolium) foliis oppositis. *Lin. Sp. pl.*

**LYCOPODIUM** (clavatum) foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. *Lin. Sp. pl.*

*I Montanari si servono felicemente di questa pianta, cotta nel vino, nella diarrea, e disenteria.*

**SAGINA** (procumbens) ramis procumbentibus, petalis brevissimis. *Lin. Sp. pl.*

*In un fosso passato il Sestajone*

**ANCHUSA** (undulata) strigosa, foliis linearibus dentatis, pedicellis bractea minoribus, calycibus fructiferis inflatis. *Lin. Sp. pl.*

*Ne' sassi scoscesi de' precipitosi balzi verso il masso, detto la Monaca*

**SAXIFRAGA** (aspera) foliis caulinis lanceatis alternis spinoso-ciliatis, caule inferne procumbente. *Lin. Sp. pl.*

*In proporzione, che io saliva le Alpi, trovavo le foglie di questa pianta più brevi, e più compatte; il fusto più corto, e con meno fiori: a segno che poco differiva dall'altra specie, detta dal Lin. Saxifraga bryoides; il di cui scapo l'ho osservato ora con un solo fiore, ora con due, ora con tre.*

**SAXIFRAGA** (caesia) foliis linearibus subtus punctatis aggregatis recurvatis, caule nudo, multifloro. *Lin. Sp. pl.*

**VALERIANA** (montana) floribus triandris, foliis ovato-oblongis subdentatis, caule simplicibus. *Lin. Sp. pl.*

Ai

31

Ai pinnacoli altissimi della Piastra, tra scogli  
immensi

**SAXIFRAGA** alpina, Muscoides, foliis superioribus oblongis, inferioribus rotundioribus, & circumactis. *Sequier suppl. 203. tab. V. fig. 3.*

*Pianta rarissima, il di cui scapo ora porta un solo fiore, ora due, ora tre fiori.*

**SAXIFRAGA** (adscendens) foliis caulinis cuneiformibus, apice dentatis; caule adscendente subvillosa. *Lin. Sp. pl.*

**SAXIFRAGA** (Cotyledon y) foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo - ferratis, caule paniculato. *Lin. Sp. pl.*

**SAXIFRAGA** sedi folio, flore albo, multiflora. *J. R. H.*

**SEDUM** (stellatum) foliis planiusculis angulatis, floribus lateralibus sessilibus solitariis. *Lin. Sp. pl.*

**PRIMULA** (Auricula E) foliis ferratis glabris. *Lin. Sp. pl.*

*Delle foglie di quest'erba si servono gli Alpigiani, come di un salutare balsamo, per le ferite.*

**JUNIPERUS** (communis y) foliis ternis patentibus mucronatis, baccà longioribus. *Lin. Sp. pl.*

**MISPILUS** (Amelanchier) inermis, foliis ovalibus ferratis, cauliculis hirsutis. *Lin. Sp. pl.*

**MESPILUS** (Cotoneaster) inermis, foliis ovatis integerrimis. *Lin. Sp. pl.*

**CHRYSANTHEMUM** (corymbiferum) foliis pinnatis, inciso-ferratis, caule multifloro. *Lin. Sp. pl.*

**ANEMONE** (Pulsatilla) pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. *L. Sp. pl.*

DO.

**DORONICUM** (Bellidiastrum) scapo nudo simplicissimo unifloro. *Lin. Sp. pl.*

*Sembrerebbe appartenere piuttosto al genere del Senecione.*

**GENTIANA** (Amarella) corollis quinquefidis, hypocrateriformibus, fauce barbatis. *L. Sp. pl.*

**INULA** (montana) foliis lanceolatis hirsutis integerrimis; caule unifloro; calyce brevi, imbricato. *Lin. Sp. pl.*

*Il Linneo pone per nota caratteristica di questa specie il fusto con un solo fiore. Ma più di una volta fu osservato in questa medesima dal Sig. Medico Bellardi con due, e tre fiori, ramoso.*

**SIDERITIS** (Hyslopifolia) foliis lanceolatis, glabris integerrimis; bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus. *Lin. Sp. pl.*

**ARNICA** (Scorpioides) foliis alternis serratis. *Lin. Sp. pl.*

**VERONICA** (latifolia) racemis lateralibus, foliis cordatis rugosis dentatis; caule stricto. *Lin. Sp. pl.*

**EUPHORBIA** (Apios) umbellâ quinquefidâ, bifidâ, involucellis obcordatis. *Lin. Sp. pl.*

**SILENE** (rupestris) floribus erectis, petalis emarginatis; calycibus teretibus; foliis lanceolatis. *Lin. Sp. pl.*

**VALERIANA** (Saxatilis) floribus triandris; foliis subdentatis, radicalibus ovatis, caulinis lineari-lanceolatis. *Lin. Sp. pl.*

**ROSA** (alpina) germinibus ovatis, pedunculis subhispidis, caule inermi. *Lin. Sp. pl.*

**GERANIUM** (sylvaticum) pedunculis bifloris; foliis subpeltatis quinquelobis inciso-serratis; caule erecto; petalis emarginatis. *L. Sp. pl.*

POA



POA (nemoralis) paniculâ attenuatâ, spiculis  
subbifloris mucronatis scabris, culmo incur-  
vo. *Lin. Sp. pl.*

MILIUM (confertum) floribus paniculatis,  
confertis. *Lin. Sp. pl.*

Non molto dopo

EMPETRUM (nigrum) procumbens. *Lin. Sp. pl.*

Su le Alpi del Lago nero

PINGUICULA (alpina) nectario conico petalo  
breviore. *Lin. Sp. pl.*

PEDICULARIS (rostrata) caule subramoso,  
corollis galeâ rostrato-acuminatis, calycibus  
subhirsutis. *Lin. Sp. pl.*

SENECIO (Sarracenicus) corollis radiantibus,  
floribus corymbosis, foliis lanceolatis  
ferratis glabriusculis. *Lin. Sp. pl.*

CALTHA (palustris). *Lin. Sp. pl.*

OROBUS (luteus) foliis pinnatis ovato-oblongis,  
stipulis rotundato-lunatis dentatis,  
caule simplici). *Lin. Sp. pl.*

*Le stipole di questa pianta le osservai diverse  
da quelle, che descrive il Linneo, cioè le vi-  
di semisagittate, e intere.*

SAXIFRAGA (Cotyledon) foliis radicatis ag-  
gregatis lingulatis cartilagineo-ferratis, cau-  
le paniculato. *Lin. Sp. pl.*

SAXIFRAGA (aspera) foliis caulinis lanceo-  
latis alternis spinoso-ciliatis, caule inferne  
procumbente. *Lin. Sp. pl.*

EPILOBIUM (alpinum) foliis oppositis ova-  
to-lanceolatis integerrimis, filiquis sessilibus,  
caule repente. *Lin. Sp. pl.*

EPILOBIUM (tetragonum) foliis lanceolatis  
den-

denticulatis, imis oppositis, caule tetragono. *Lin. Sp. pl.*

**CIRCÆA** (alpina) caule adscendente, racemo unico. *Lin. Sp. pl.*

**JUNCUS** (campestris) foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque. *Lin. Sp. pl.*

**FESTUCA** (vivipara) spiculis viviparis. *Lin. Sp. pl.*

**POA** (alpina) paniculâ diffusâ ramosissimâ, spiculis sexfloris cordatis. *Lin. Sp. pl.*

**AGROSTIS** (calamagrossis) paniculâ incrassatâ, petalo anteriore toto lanato, apice aristato, caule ramoso. *Lin. Sp. pl.*

Al Lago nero

**VIOLA** (calcarata) caule abbreviato; floris nectario subulato petalis longiore, foliis subovatis, stipulis dentatis. *Lin. Sp. pl.*

**VIOLA** (biflora) caule bifloro, foliis reniformibus serratis. *Lin. Sp. pl.*

Dal detto Lago si scese ne' prati verso la Madonna dell' Acero, ove ritrovammo

**CNICUS** (spinosissimus) foliis amplexicaulibus sinuato-pinnatis spinosis, caule simplici, floribus sessilibus. *Lin. Sp. pl.*

*Che il medesimo Scheuzero asserisce nel suddetto viaggio, crescere in abbondanza ne' pascoli delle Alpi, e particolarmente verso le case, e stalle alpine.*

Attraversata tutta la gran prateria, calammo a Casa Palaja; indi allo Spedaletto, e Montelanci; alle di cui radici

**VALERIANA** (Saxatilis) floribus triandris, foliis subdentatis, radicalibus ovatis, caulinis lineari-lanceolatis. *Lin. Sp. pl.*

CAR-

CARDUUS (acaulis) acaulis, calyce glabro.

*Lin. Sp. pl.*

Trovai un cespuglio di questo Cardo, da cui *sorti-*  
vono alcuni fiori senza fusto; altri con esso.

Nel detto monte

GENTIANA (acaulis) corollâ quinquefidâ  
campanulatâ, caulem excedente. *L. Sp. pl.*

Continuando la strada, trovammo

CYNOGLOSSUM (Apenninum) flaminibus  
corollam æquantibus. *Lin. Sp. pl.*

Arrivammo a Fanano; scavalcammo il monte

S. Michele delle Canovare; sovramontammo

gran tratto di paese verso le Alpi più rile-

vate. Già siamo allo smisurato Cimone di

Fanano, assai per altro scarso di Semplici;

nella di cui salita ritrovammo a un fonte

CALTHA (palustris). *Lin. Sp. pl.*

SAXIFRAGA (oppositifolia) foliis caulinis  
ovatis, oppositis imbricatis, summis ciliatis.

*Lin. Sp. pl.*

SAXIFRAGA (tridaetylites) foliis *caulinis* cu-  
neiformibus trifidis alternis, caule erecto ra-  
moso. *Lin. Sp. pl.*

DROSER (rotundifolia) scapis radicatis,  
foliis orbiculatis. *Lin. Sp. pl.*

INULA (Britannica) foliis amplexicaulibus  
lanceolatis distinctis ferratis, subtus villosis,  
caule ramoso villoso erecto. *Lin. Sp. pl.*

In una rupe scoscesa

CAMPANULA rotundifolia minima. *B.*

FILAGO (Leontopodium) caule simplicissi-  
mo, capitulo terminali, bracteis hirsutissimis  
radiato. *Lin. Sp. pl.*

Felicamente se ne servono gli Alpigiani di quest'

*erba, pestata, e cotta nell' olio, nelle contusioni.*

**SILENE** (acaulis). *Lin. Sp. pl.*

Sul Cimone di Fanano

**LINARIA** alpina tetraphylla, floribus violaceis parvis. *Mich.*

**ARBUTUS** (Uva Urſi) caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Lin. Sp. pl.*

**SOLDANELLA** (alpina). *Lin. Sp. pl.*

**SEDUM** (Anacampſeros) foliis cuneiformibus integerrimis, caulibus decumbentibus, floribus corymbosis. *Lin. Sp. pl.*

**PINGUICULA** (vulgaris) nectario cylindraceo longitudine petali. *Lin. Sp. pl.*

Superato quel piccolo residuo di erta; su la mano dritta tra' scogli

**GERANIUM** (argenteum) pedunculis bifloris, foliis subpeltatis septempartitis trifidis, tomentoso-sericeis, petalis emarginatis. *Lin. Sp. pl.*

Discendendo a Fiumalbo, per quei ripidissimi prati

**SPIRÆA** (Aruncus) foliis supradecompositis, spicis paniculatis, floribus dioicis. *L. Sp. pl.*

**ERIOPHORUM** (alpinum) culmis nudis triquetris, spica pappo brevior. *Lin. Sp. pl.*

**MOHERINGIA** (muscosa). *Lin. Sp. pl.*

**OPHRYS** (ovata) bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectari labio bifido. *Lin. Sp. pl.*

*Quando i Montanari non possono avere le foglie dell' Auricula, si servono per le ferite di un balsamo fatto dell' infusione in Olio di Oliva di quest' erba.*

Con-

37  
Continuando la scea a mano dritta , passando  
a traverso de' monti

SILENE (nutans) petalis bifidis , floribus lateralibus secundis cernuis , paniculâ nutante . *Lin. Sp. pl.*

Arrivammo finalmente al rinomato prato , detto della Fonte de' Carboni , fertilissimo di rare piante alpine , quali per altro per una improvvisa pioggia non ci fu permesso di esaminare con attenzione, solamente raccolsi

T ROLLIUS (Europæus) corollis conniventibus , nectariis longitudine staminum. *L. Sp. pl.*

RANUNCULUS (Aconitifolius) foliis omnibus quinatis lanceolatis inciso - serratis . *Lin. Sp. pl.*

SPIRÆA (ulmaria) foliis pinnatis , impari majore lobato , floribus cymosis . *Lin. Sp. pl.*

SCANDIX (odorata) feminibus fulcatis angulatis . *Lin. Sp. pl.*

ERIOPHORUM (alpinum) culmis nudis triquetris , spica pappo brevior . *Lin. Sp. pl.*

Trovai quivi un Veratro con le foglie tomentose , stato osservato ne' prati subalpini della Savoia ancora dal Sig. Medico Bellardi .

Nel luogo , detto Porcelletti , volevo riconoscere quest' erba , chiamata dagli Alpigiani erba Nucitola , che il P. Boccone ci descrive nel suo Museo di piante rare p. 24. Tab.

3. col nome di Libanotis Italica , alpina , semine cryspo ; ma tutte le mie diligenze nel cercarla furono inutili .

Nella boscaglia delle Tagliole pendeva da quegli annosi Faggi

LICHEN (pulmonarius) foliaceus laciniatus  
C 1 ob.

obtusius glaber, supra lacunosus, subtus tomentosus. *Lin. Sp. pl.*

Sotto l'ombra di detti alberi

ADOXA (Moschatellina). *Lin. Sp. pl.*

VACCINIUM (uliginosum) pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus, basis ciliatis. *Lin. Sp. pl.*

*Questi cigli nella base delle foglie mai gli ho osservati.*

MARCHANTIA (polymorpha) calyce comuni decemfido. *Lin. Sp. pl.*

LYCOPODIUM (Selago) foliis sparsis octifariis, caule dichotomo erecto fastigiato, floribus sparsis. *Lin. Sp. pl.*

*Che il Rajo dice nascere ne' monti della Francia; e che Scheuzero raccolse ne' monti degli Svizzeri, dandone un' accurata descrizione ne' suoi viaggi alpini.*

Arrivammo alla cima delle Alpi tra il Lago nero a mano manca, e il Lago santo a destra; inviandoci quindi verso le Alpi di Lucca

ACHILLEA (Clavennæ) foliis laciniatis planis obtusis tomentosis. *Lin. Sp. pl.*

*Di questa pianta ne dà una buona figura il Clusio, col nome di Absinthium alpinum umbelliferum. Ottima per la debolezza del ventricolo.*

SAXIFRAGA (aspera) foliis caulinis lanceolatis alternis spinoso-ciliatis, caule inferne procumbente. *Lin. Sp. pl.*

*Trovata dallo Scheuzero nelle Alpi di Settimo &c.; e di cui ne dà un' elegante figura ne' suoi viaggi alpini Tab. 20. Fig. 3.*

Do-

Dopo un lungo, disastroso cammino, passiamo per quella via, che dal Lago nero conduce a Monte Fegatese. Alla ferra di que' macigni, che pare scendino dalla montagna di Controne

**ASCLEPIAS** ( *Vincetoxicum* ) foliis ovatis, basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Lin. Sp. pl.*

*Nelle febbri acute si servono gli Alpighiani della sua radice per provocare il sudore.*

**SONCHUS** ( *alpinus* ) pedunculis squamosis, floribus racemosis, foliis runcinatis. *Lin. Sp. pl.*

Passando per Tireglio, Gagliano, e la Madonna della Romita

**GNAPHALIUM** ( *dioicum* ) sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbis simplici terminali, floribus dioicis. *Lin. Sp. pl.*

*Con ottimo successo si servono i Montanari de' fiori secchi di quest' erba, in tempo d' Inverno, per la tosse, e per provocare l' espettorazione.*

**VALERIANA** ( *rubra* ) floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Lin. Sp. pl.*

Entrati nello Stato Lucchese: a Vergemoli, e Calomini

**IBERIS** ( *umbellata* ) herbacea, foliis lanceolatis acuminatis, inferioribus serratis, superioribus integerrimis. *Lin. Sp. pl.*

**SATUREIA** ( *montana* ) pedunculis dichotomis lateralibus solitariis, foliis lineari-lanceolatis mucronatis. *Lin. Sp. pl.*

*Il maggiore uso, che si faccia in montagna di quest'*

*quest' erba, si è nel provocare i mestrui.*

**SCABIOSA** (Graminifolia) corollulis quinquefidis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, caule herbaceo. *Lin. Sp. pl.*

**HYOSERIS** (foetida) scapis simplicissimis unifloris, foliis pinnatifidis, seminibus nudis. *Lin. Sp. pl.*

In un gran masso

**ARABIS** (alpina) foliis amplexicaulibus dentatis. *Lin. Sp. pl.*

**DORONICUM** (pardalianches  $\beta$ ) foliis cordatis obtusis denticulatis, radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Lin. Sp. pl.*

**ASPLENIUM** (Ruta muraria) frondibus alternatim decompositis, foliis cuneiformibus crenulatis. *Lin. Sp. pl.*

**PHILLYREA** (latifolia) foliis cordato-ovatis ferratis. *Lin. Sp. pl.*

Incontro a Ghivizano

**ASPLENIUM** (Scolopendrium  $\epsilon$ ) frondibus simplicibus cordato-lingulatis integerrimis, stipitibus hirsutis. *Lin. Sp. pl.*

Per i prati, oltre le solite piante alpine

**LASERPITIUM** (Siler) foliolis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. *Lin. Sp. pl.*

*Si servono gli Alpigiani della sua radice per medicamento apoplegmaticizzante ne' dolori de' denti.*

**CARDUUS** (defloratus) foliis decurrentibus lanceolatis ferratis subspinoso-ciliatis nudis, pedunculis longissimis lanuginosis unifloris. *Lin. Sp. pl.*

**IMPERATORIA** (Ostruthium). *Lin. Sp. pl.*

*Per l' uso grande, che ne fanno i Montanari nell'*



nell' *Astma*, viene autenticata tale virtù in questa pianta.

Su l'Alpe di Controne

**LIGUSTICUM** (*Levisticum*) foliis multiplicibus; foliolis superne incis. *Lin. Sp. pl.*

**THYMUS** (*alpinus*) verticillis sexfloris, foliis obtusiusculis concavis subserratis. *L. Sp. pl.*

Se ne servono di questa pianta gli *Alpigiani* nelle malattie di petto.

**SCORZONERA** (*Hispanica*) caule ramoso, foliis amplexicaulibus integris ferrulatis. *Lin. Sp. pl.*

**GENTIANA** (*utriculosa*) corollis quinquefidis hypocrateriformibus, calycibus plicato-alatis. *Lin. Sp. pl.*

**BUNIUM** (*Bulbocastanum*). *Lin. Sp. pl.*

**ATHAMANTA** (*Meum*) foliolis capillaribus, seminibus glabris striatis. *Lin. Sp. pl.*

**LILIUM** (*Martagon*) foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Lin. Sp. pl.*

**LILIUM** (*Chalcedonicum*) foliis sparsis lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Lin. Sp. pl.*

**CREPIS** (*vesicaria*) involucris ovatis concavis obtusis patentibus. *Lin. Sp. pl.*

**HIERACIUM** (*præmorsum*) foliis subdentatis, scapo nudo racemoso, floribus superioribus primoribus. *Lin. Sp. pl.*

**HIERACIUM** (*alpinum*) foliis oblongis integris dentatis, scapo subnudo unifloro, calyce piloso. *Lin. Sp. pl.*

**HIERACIUM** *statices folio*. *Vaill. Haller. bist. stirp. Helv.*

Io ho sempre sospettato, che questa specie di *Jeracis*

racio fosse l'istessa di quella, che il Linneo chiama *Porrifolium*: di cui ne dà una buona figura M. Jacquin in *enum. pl. agri Vindob.* Ma il Sig. Medico Bellardi mi assicura avere molte volte seminato il nostro *Jeracio*, e costantemente conservato il suo abito, e giammai degenerato nel *Porrifolio*, il quale ancora non è stato trovato nelle Alpi del Piemonte; laddove è comune il nostro, e singolarmente lungo i torrenti, conservando sempre l'istesso abito esteriore: con tale differenza, che alle volte ritrovasi il di lui scapo con un solo fiore, altre volte con due, o più fiori. Quindi il dottissimo Sig. Allioni in *actuario ad Sinopsim methodicam stirpium H. R. T.* lo chiama col nome triviale di *Hieracium staticifolium*.

**HIERACIUM** (*villosum*) caule ramoso folioso, foliis hirtis, radicalibus lanceolato-ovatis dentatis, caulinis amplexicaulibus cordatis. *Lin. Sp. pl.*

**THALICTRUM** (*Aquilegifolium*) fructibus pendulis triangularibus rectis, caule tereti.  
*Lin. Sp. pl.*

**PÆONIA** (*officinalis mascula*) foliolis oblongis. *Lin. Sp. pl.*

**GENTIANA** (*nivalis*) corollis quinquefidis infundibuliformibus, ramis unifloris alternis.  
*Lin. Sp. pl.*

**GENTIANA** (*Amarella*) corollis quinquefidis hypocrateriformibus, fauce barbatis.  
*Lin. Sp. pl.*

**CHRYSANTHEMUM** (*atratum*) foliis omnibus cuneiformi-oblongis serratis carnosis.  
*Lin. Sp. pl.*

CEN-

- CENTAUREA** (Cineraria) calycibus ciliatis terminali-sefilibus, foliis tomentosis bipinnatifidis, lobis acutis. *Lin. Sp. pl.*
- CENTAUREA** (montana) calycibus ferratis, foliis lanceolatis decurrentibus, caule simplicissimo. *Lin. Sp. pl.*
- CARDUUS** (mollis) foliis pinnatifidis linearibus subtus tomentosis, caule inermi unifloro. *Lin. Sp. pl.*
- SPIRÆA** (Filipendula) foliis pinnatis, foliolis uniformibus ferratis, caule herbaceo, floribus cymosis. *Lin. Sp. pl.*
- SCABIOSA** (Graminifolia) corollulis quinquefidis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, caule herbaceo. *Lin. Sp. pl.*
- SCABIOSA** (integrifolia) corollulis quadrifidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis serratis, rameis lanceolatis, caule herbaceo. *Lin. Sp. pl.*
- SCABIOSA** (alpina) corollulis quadrifidis æqualibus, floribus cernuis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ferratis. *Lin. Sp. pl.*
- LUNARIA** (annua) foliis oppositis. *L. Sp. pl.*
- DORONICUM** (Plantagineum) foliis ovatis acutis subdentatis, ramis alternis. *Lin. Sp. pl.*
- SEMPERVIVUM** (montanum) foliis ciliatis, propaginibus patulis. *Lin. Sp. pl.*
- SAXIFRAGA** (Geum) foliis reniformibus dentatis, caule nudo paniculato. *Lin. Sp. pl.*
- PEDICULARIS** (rostrata) caule subramoso, corollis galeâ rostrato-acuminatis, calycibus subhirsutis. *Lin. Sp. pl.*
- PEDICULARIS** (verticillata) caule simplici, foliis quaternis. *Lin. Sp. pl.*

Su

Su la montagna, detta Pizo di uccello, nella parte superiore, ed altissima

**ARTEMISIA** (glacialis) foliis palmatis multifidis sericeis, caulibus adscendentibus, floribus glomeratis subfastigiatis. *Lin. Sp. pl.*

Molte, e diverse sono quelle piante, cui i Montanari per l'uniformità nelle loro virtù, danno l'istesso nome vernacolo di Genepi; e se ne servono in tutti que' mali, che richiedono di promuovere il sudore. Questa è una di quelle; e di cui ce ne dà un'ottima descrizione con una bella figura il Signor Dott. Allioni: Specim. pl. Pedem. 5. Tab. 1. fig. 3.

**EUPHORBIA** (ferrata) umbellâ quinquefidâ trifidâ dichotomâ, involucellis diphyllis reniformibus, foliis amplexicaulibus cordatis ferratis. *Lin. Sp. pl.*

**EUPHORBIA** (verrucosa) umbellâ quinquefidâ subtrifidâ bifidâ, involucellis ovatis, foliis lanceolatis ferratis. *Lin. Sp. pl.*

**ARNICA** (Scorpioides) foliis alternis ferratis. *Lin. Sp. pl.*

**MELITTIS** (Melissophyllum). *Lin. Sp. pl.*

**HYPERICUM** (coris) floribus triginis, calycibus ferrato-glandulosis, foliis subverticillatis. *Lin. Sp. pl.*

**SAXIFRAGA** (Cotyledon) foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-ferratis, caule paniculato. *Lin. Sp. pl.*

**CENTAUREA** (scabiosa) calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis, pinnis lanceolatis. *L. Sp. pl.*

**ASCLEPIAS** (Vincetoxicum) foliis ovatis, basi barbatis, caule erecto, umbellis proli-  
ris. *Lin. Sp. pl.*

VA-

**VALERIANA** (tripteris) floribus triandris,  
foliis dentatis, radicalibus cordatis, caulinis  
ternatis ovato-oblongis. *Lin. Sp. pl.*

**LIGUSTICUM** Ferulaceum. *Allion. Miscel.  
Taurin. Tom. 5.*

**FOENICULUM** sylvestre, elatius, Ferule fo-  
lio longiore. *J. R. H.*

**ASPERULA** (cynanchica) foliis quaternis li-  
nearibus, superioribus oppositis stipulatis, cau-  
le erecto, floribus quadrifidis. *Lin. Sp. pl.*

**LITHOSPERMUM** (fruticosum) fruticosum,  
foliis linearibus hispidis, staminibus corollam  
subæquantibus. *Lin. Sp. pl.*

*Di questa piccola erba ne dà una bella figura  
M. Garidel aiu. 68. t. 15.*

**GLOBULARIA** (cordifolia) caule subnudo,  
foliis cuneiformibus tricuspidatis, interme-  
dio minimo. *Lin. Sp. pl.*

**SIDERITIS** (Hyssopifolia) foliis lanceolatis  
glabris integerrimis; bracteis cordatis denta-  
to-spinosis, calycibus æqualibus. *Lin. Sp. pl.*

**IBERIS** (garexiana) perennis, foliis linearibus  
obtusis integerrimis. *Allion. Misc. Taur. t. 5.*

Sul monte di Ajola evvi un Convento di Re-  
ligiosi di Montesenario, intorno a cui

**JUNIPERUS** (Sabina) foliis oppositis erectis  
decurrentibus, oppositionibus pyxidatis. *Lin.  
Sp. pl.*

**RHAMNUS** (Alaternus) inermis, floribus dioi-  
cis, stigmate triplici, foliis serratis. *L. Sp. pl.*

Indi si scese in un' amena valle, ove cravi  
quantità di

**ACTÆA** (spicata nigra) racemo ovato, fructi-  
busque baccatis. *Lin. Sp. pl.*

Su

Su la cima della Pania secca, tutta ripiena di  
scogli

**SEDUM** (rubens) foliis subformibus subdepressis infimis quaternis, cimâ subquadrifidâ, floribus pentrandris, staminibus reflexis. *L. Sp. pl.*

*Incontrato ancora dallo Scheuzero, ed Haller per le montagne degli Svizzeri.*

Ivi arrampicandomi con le mani, e piedi per un precipitosissimo balzo, niente, o poco atterrito dalle compassionevoli voci di alcuni pastori, che mi dissuadevano a tale salita, trovai tra que' smisurati massi

**FUMARIA** (Capnoides) filiquis linearibus tetragonis, caulibus diffusis acutangulis. *L. Sp. pl.*

**AQUILEGIA** (alpina) nectariis rectis, petalo lanceolato brevioribus. *Lin. Sp. pl.*

**ANTHYLLIS** (montana) herbacea; foliis pinnatis æqualibus, capitulo terminali secundo, floribus obliquatis. *Lin. Sp. pl.*

**DRYAS** (octopetala) floribus octopetalis; foliis simplicibus. *Lin. Sp. pl.*

**VERONICA** (aphylla) corymbo terminali, scapo nudo. *Lin. Sp. pl.*

*Ritrovata dal Boccone in una selva tra Fiumalbo, e Barga, e da esso chiamata Veronica alpina pumilla, caule aphylo. Mus. 2. p. 17. t. 1. e 9. Nasce ancora nelle due Panie, ritrovatavi da me più di una volta.*

Tra le fisure di que' sassi

**GALIUM** (minutum) foliis octonis lanceolatis mucronatis serrato-aculeatis, glabris incurvis, fructibus reflexis. *Lin. Sp. pl.*

Uscito da quel pericolosissimo balzo

**ALLIUM** (rotundum) caule planifolio, umbel-

bellifero, staminibus tricuspidatis, umbellâ subglobosâ, floribus lateralibus nutantibus. *Lin. Sp. pl.*

*Allium montanum* sphærocephalum purpureum, trovato, e descritto, unitamente alla di lui figura, dallo Scheuzero ne' suoi viaggi alpini p. 24. Tab. 3. f. 2.

**ASTRANTIA** (minor) foliis digitatis ferratis. *Lin. Sp. pl.*

Detta dal Boccone *Helleborus minimus alpinus*, *Astrantiæ* flore. Sic. 10. t. 6. soggiungendo ivi, che gignitur in vertice Panix montis in Hetruria.

Tra que' massi

**VALERIANA** (Saxatilis) floribus triandris, foliis subdentatis, radicalibus ovatis, caulibus lineari-lanceolatis. *Lin. Sp. pl.*

**LITHOSPERMUM** (fruticosum) fruticosum, foliis linearibus hispidis, staminibus corollam subæquaminibus. *Lin. Sp. pl.*

Che pareva carico di tanti Zaffiri, quanti vi si vedevano fiori di così bell' azzurro coloriti.

**SILENE** (rupestris) floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus teretibus, foliis lanceolatis. *Lin. Sp. pl.*

**SCABIOSA** (Graminifolia) corollulis quinquefidis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, caule herbaceo. *Lin. Sp. pl.*

**ASTRAGALUS** (alpinus) caulescens procumbens, floribus pendulis racemosis, leguminibus utrimque acutis pilosis. *Lin. Sp. pl.*

**POTENTILLA** (rupestris) foliolis pinnatis alternis, foliolis quinque ovatis crenatis, caule erecto. *Lin. Sp. pl.*

GNA.

**GNAPHALIUM** (alpinum) sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, capitulo terminali aphylo, floribus oblongis. *Lin. Sp. pl.*

**SOLDANELLA** (alpina). *Lin. Sp. pl.*

**IBERIS** (Saxatilis) suffruticosa, foliis lanceolato-linearibus carnosis acutis integerrimis ciliatis. *Lin. Sp. pl.*

**SAXIFRAGA** (autumnalis) foliis caulinis linearibus alternis ciliatis, radicalibus aggregatis. *Lin. Sp. pl.*

**SAXIFRAGA** (sedoides) foliis caulinis aggregatis alternis oppositisque sublanceolatis, flore pedunculato. *Lin. Sp. pl.*

**SESELI** (pumilum) petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliolis ternatis, linearibus subcarnosis, petioli longitudine. *Lin. Sp. pl.*

**CORONILLA** (Valentina) fruticosa, foliis subnovenis, stipulis suborbiculatis. *L. Sp. pl.*

**ARBUTUS** (Uva Ursi) caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Lin. Sp. pl.*

**DAPHNE** (Cneorum) floribus congestis terminalibus sessilibus, foliis lanceolatis nudis. *Lin. Sp. pl.*

Al Pisanico

**FRAXINUS** (Ornus) foliolis serratis, floribus corollatis. *Lin. Sp. pl.*

**CARPINUS** (Betulus) squamis strobilorum planis. *Lin. Sp. pl.*

**VIBURNUM** (Lantana) foliis cordatis serratis venosis subtus tomentosis. *Lin. Sp. pl.*

**LONICERA** (alpigena) pedunculis bifloris, baccis coadunatis didymis. *Lin. Sp. pl.*

TI-



**TILIA** (Europæa) floribus nectario - destitutis. *Lin. Sp. pl.*

*Con la polvere delle bacche fermano i Montanari i flussi del ventre.*

**ACER** (Pseudo-platanus) foliis quinquelobis inæqualiter serratis, floribus racemosis. *Lin. Sp. pl.*

**CRATÆGUS** (Aria) foliis ovatis inæqualiter serratis, subtus tomentosis. *Lin. Sp. pl.*

**SORBUS** (aucuparia) foliis pinnatis, utrimque glabris. *Lin. Sp. pl.*

**CYTISUS** (hirsutus) pedunculis simplicibus lateralibus, calycibus hirsutis trifidis ventricoso-oblongis. *Lin. Sp. pl.*

**PIMPINELLA** (Saxifraga) foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus. *Lin. Sp. pl.*

**ASTRANTIA** (minor) foliis digitatis serratis. *Lin. Sp. pl.*

**SCANDIX** (odorata) feminibus fulcatis, angulatis. *Lin. Sp. pl.*

**HERACLEUM** (spondylium) foliolis pinnatifidis. *Lin. Sp. pl.*

**LASERPITIUM** (latifolium) foliolis cordatis inciso-serratis. *Lin. Sp. pl.*

**ASPHODELUS** (ramosus) caule nudo, foliis ensiformibus carinatis lævibus. *Lin. Sp. pl.*

**AQUILEGIA** (alpina) nectariis rectis, petalo lanceolato brevioribus. *Lin. Sp. pl.*

**SCABIOSA** (integrifolia) corollulis quadrifidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis serratis, rameis lanceolatis, caule herbaceo. *Lin. Sp. pl.*

**HYOSERIS** (radiata) scapis unifloris nudis, fo-

foliis glabris runcinatis, angulis dentatis.  
*Lin. Sp. pl.*

**INULA** (Britannica) foliis amplexicaulibus lanceolatis distinctis ferratis, subtus villosis, caule ramoso villoso erecto. *Lin. Sp. pl.*

**ACTÆA** (spicata) racemo ovato, fructibusque baccatis. *Lin. Sp. pl.*

**VERATRUM** (album) racemo supradecomposito, corollis erectis. *Lin. Sp. pl.*

**PÆONIA** (officinalis fœmina) foliolis oblongis. *Lin. Sp. pl.*

**PARIS** (quadrifolia). *Lin. Sp. pl.*

**PRIMULA** (Auricula  $\beta$ ) foliis ferratis glabris. *Lin. Sp. pl.*

Su l'altissima Pania, detta il Fato nero

**CARDUUS** (acaulis) acaulis calyce glabro.  
*Lin. Sp. pl.*

**CARDAMINE** (Refedifolia) foliis inferioribus indivisis, superioribus trilobis. *Lin. Sp. pl.*

Passato all'altra Pania

**SAXIFRAGA** (tridactylites) foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. *Lin. Sp. pl.*

**CERASTIUM** (latifolium) foliis ovatis subtomentosis, ramis subunifloris, capsulis globosis. *Lin. Sp. pl.*

**POLYGALA** (Chamæbuxus) floribus imberbibus sparsis, carinâ apice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis. *Lin. Sp. pl.*

**LEPIDIUM** (alpinum) foliis pinnatis integerrimis, scapo subradicato, siliculis lanceolatis mucronatis. *Lin. Sp. pl.*

**RHAMNUS** (Frangula) inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis.  
*Lin. Sp. pl.*

Qui

Qui fu dove aggravandomisi l'infiammazione di gola, che da qualche giorno mi molestava, con sommo, inesplicabile cordoglio fui costretto a tutta forza di ritornare alla Città. Eccovi dunque servito nel miglior modo, che mi è stato possibile. Mi lusingo frattanto, che voi rimarrete persuaso, essere questo un piccolo saggio di quelle tante, e rarissime piante alpine, delle quali chi ne volesse tessere una ben dettagliata relazione, avrebbe bisogno di maggiore agio, e comodo, che a tutti non può essere concesso.

**F I N E .**

*Vidia*

*Vidit Dom. Aurelius Castanea Clericus Regularis Sancti Pauli, & in Ecclesia Metropolitana Bononiæ Pœnitentiarius pro Eminentissimo, & Reverendissimo Domino D. Vincentio Cardinali Malvetio Archiepiscopo Bononiæ, & S. R. I. Principe.*

*Die 5 Augusti 1773.*

**IMPRIMATUR.**

*F. Pius Olleari Bellagente Provicarius Sancti Officii Bononiæ.*

99 943253